

CARTE DE PATIENT POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Apixaban

Cette carte doit être portée en permanence sur soi par la personne concernée, l'enfant ou la personne qui s'occupe de lui. Montrez cette carte à votre pharmacien, à votre dentiste et à tous vos médecins avant de commencer un traitement.

Informations destinées aux patients et aux aidants

- Prenez/administrez l'apixaban régulièrement, conformément aux instructions de votre médecin. Si vous avez oublié de prendre/administrer le comprimé le matin, prenez-le/administrez-le dès que vous vous en rendez compte ; vous pouvez le prendre/l'administrer ensemble avec la dose du soir. Si vous avez oublié une dose du soir, celle-ci ne doit être prise/administrée que le soir même. Ne prenez pas/n'administrez pas deux doses le lendemain matin (une seule) ; reprenez plutôt le traitement comme d'habitude, à raison de deux fois par jour, conformément aux recommandations, dès le lendemain.



Matériel d'information exigé
par l'autorité compétente

- N'interrompez pas le traitement par l'apixaban sans en avoir préalablement discuté avec votre médecin, car vous/le patient présentez un risque d'accident vasculaire cérébral, de formation de caillots sanguins ou d'autres complications.
- L'apixaban contribue à fluidifier le sang. Cela peut toutefois augmenter le risque d'hémorragie.
- Les signes et symptômes d'une hémorragie peuvent inclure des ecchymoses ou des hématomes sous-cutanés, des selles goudronneuses, du sang dans les urines, des saignements de nez, des vertiges, de la fatigue, une pâleur, une faiblesse, des maux de tête soudains et intenses, des crachats de sang ou des vomissements sanglants.
- **Consultez immédiatement un médecin**, si vos saignements ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes.
- Si une intervention chirurgicale ou une procédure invasive s'avère nécessaire pour vous/le patient, veuillez informer le médecin traitant, avant l'intervention, que vous/le patient prenez/prend de l'apixaban.

Je suis traité avec l'anticoagulant apixaban afin de prévenir la formation de caillots sanguins.

Informations destinées aux médecins et aux pharmaciens

- L'apixaban est un anticoagulant oral qui agit par inhibition directe et sélective du facteur Xa de la coagulation sanguine.
- L'apixaban peut augmenter le risque d'hémorragie. En cas d'hémorragie grave, le traitement par l'apixaban doit être immédiatement interrompu.
- Le traitement par l'apixaban ne nécessite pas de surveillance systématique de l'exposition. Un test quantitatif calibré anti-facteur Xa peut s'avérer utile dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas de surdosage ou d'interventions chirurgicales d'urgence (les tests de coagulation tels que le temps de prothrombine (PT), le rapport international normalisé (INR) et le temps de thromboplastine partielle activée (aPTT) ne sont pas recommandés) – voir les informations professionnelles.
- Un médicament permettant de neutraliser l'activité anti-FXa de l'apixaban est disponible ; toutefois, son innocuité et son efficacité n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques (voir les informations professionnelles sur l'andexanet alfa).

Veuillez remplir cette section ou demander au médecin de le faire

Nom :

Date de naissance :

Poids :

Indication :

Posologie : mg 2 fois par jour

Nom du médecin :

Numéro de téléphone du médecin :

Version 2.0- État : 03/2025