

SCHEDA PAZIENTE PER UN UTILIZZO SICURO

Apixaban

Lei/il bambino/la persona che lo accudisce dovrebbe portare sempre con sé questa tessera. Mostrare questa scheda al farmacista, al dentista e a tutti i medici prima di sottoporvi a qualsiasi trattamento.

Informazioni per pazienti/accompagnatori

- Assuma/somministri l'apixaban regolarmente seguendo le istruzioni del medico. Se ha dimenticato di assumere la dose mattutina, assuma/somministri la compressa non appena se ne accorge; l'assunzione/somministrazione può avvenire insieme alla dose serale. Se si dimentica una dose serale, questa va assunta/somministrata solo quella stessa sera. La mattina seguente non assuma/somministri due dosi (una); riprenda invece l'assunzione/somministrazione come di consueto due volte al giorno, secondo le indicazioni, a partire dal giorno successivo.



Materiale informativo richiesto
dall'autorità competente

- Non interrompa il trattamento con apixaban senza aver prima consultato il medico, poiché lei/il paziente è a rischio di ictus, coaguli di sangue o altre complicanze.
- L'apixaban aiuta a fluidificare il sangue. Ciò può tuttavia aumentare il rischio di emorragie.
- I segni e i sintomi di emorragia possono essere ecchimosi o ematomi sottocutanei, feci catramose, sangue nelle urine, epistassi, vertigini, stanchezza, pallore, debolezza, forti mal di testa improvvisi, tosse con sangue o vomito sanguinante.
- **Si rivolga immediatamente a un medico**, se l'emorragia non si arresta da sola.
- Qualora fosse necessario sottoporre Lei/il paziente a un intervento chirurgico o a una procedura invasiva, informi il medico curante prima dell'intervento che Lei/il paziente sta assumendo Apixaban.

Sono in terapia con l'anticoagulante apixaban per prevenire la formazione di coaguli di sangue.

Informazioni per medici e farmacisti

- L'apixaban è un anticoagulante orale che agisce attraverso l'inibizione diretta e selettiva del fattore Xa della coagulazione del sangue.
- L'apixaban può aumentare il rischio di emorragie. In caso di emorragia grave, il trattamento con apixaban deve essere interrotto immediatamente.
- Il trattamento con apixaban non richiede un monitoraggio di routine dell'esposizione. Un test quantitativo calibrato anti-fattore Xa può rivelarsi utile in situazioni eccezionali, ad esempio in caso di sovradosaggio e di interventi chirurgici d'urgenza (i test di coagulazione quali il tempo di protrombina (PT), il rapporto internazionale normalizzato (INR) e il tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) non sono raccomandati) – vedi informazioni professionali.
- È disponibile un farmaco in grado di neutralizzare l'attività anti-FXa dell'apixaban; tuttavia, la sua sicurezza ed efficacia non sono state dimostrate nei pazienti pediatrici (vedi le informazioni professionali su Andexanet alfa).

Si prega di compilare questa sezione oppure di chiedere al medico di farlo

Nome:

Data di nascita:

Peso:

Indicazione

Dosaggio: mg 2 volte al giorno

Nome del medico:

Numero di telefono del medico:

Versione 2.0- aggiornato al: 03/2025