Devatis AG Switzerland

Fiche patient
Fingolimod-Devatis
(fingolimod)

Matériel d'information exigé par l'autorité compétente

Nom de la patiente

Coordonnées du médecin

Veuillez également consulter les informations destinées aux patients et la notice d'utilisation du Fingolimod Devatis

Contraception et grossesse

- Le fingolimod peut avoir des **conséquences graves** pour le fœtus.

- Le fingolimod ne doit pas être pris par les femmes enceintes, ni par les adolescentes et les femmes en âge de procréer qui n'utilisent pas de méthode contraceptive efficace, **pas** être pris.

- Pendant le traitement par le fingolimod et jusqu'à 2 mois après son arrêt, les patientes ne doivent **pas tomber enceintes**. Il faut continuer à utiliser une méthode contraceptive efficace.

Au début du traitement, puis régulièrement par la suite, votre médecin vous informera sur **le risque que présente le fingolimod pour le fœtus** et vous conseillera sur les mesures à prendre pour réduire ce risque au minimum.

Avant le début du traitement, il faut disposer d'un **test de grossesse négatif vérifié par le médecin.** Les tests de grossesse doivent être renouvelés à intervalles réguliers pendant le traitement.

Étant donné que le fingolimod reste dans l'organisme jusqu'à environ 2 mois après l'arrêt du traitement, vous devez **utiliser une méthode contraceptive fiable pendant le traitement et jusqu'à 2 mois après celui-ci**. Discutez avec votre gynécologue des moyens de contraception fiables et déterminez ensemble la méthode qui vous convient le mieux.

Prévenez immédiatement votre médecin si, pendant le traitement par le fingolimod ou dans les deux mois qui suivent, vous pensez être enceinte ou si vous envisagez de le devenir. Le traitement par fingolimod doit alors être immédiatement interrompu.

Si vous tombez enceinte pendant le traitement par le fingolimod, votre médecin traitant vous informera des risques pour le fœtus et évaluera les conséquences sur la grossesse dans le cadre d'un suivi médical.

Veuillez informer immédiatement votre médecin si, après la fin du traitement, **vous constatez une reprise de l'activité de la sclérose en plaques**.

Cette fiche patient relative à la grossesse ainsi que d'autres documents et informations sur le produit peuvent être téléchargés sur le site web www.devatis.ch disponibles.