Devatis AG Switzerland

Behördlich angeordnetes Informationsmaterial

Patientinnenkarte
Fingolimod-Devatis
(Fingolimod)

Name der Patientin

Kontaktdaten der Ärztin/des Arztes

Bitte beachten Sie ebenfalls die Information für Patienten und die Gebrauchsinformation zu Fingolimod Devatis

Empfängnisverhütung und Schwangerschaft

- Fingolimod kann beim ungeborenen Kind zu **schwerwiegenden Folgen** führen.

- Fingolimod darf von schwangeren Frauen sowie Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter, die keine wirksame Empfängnisverhütung anwenden, **nicht** eingenommen werden.

- Während der Behandlung mit Fingolimod und bis zu 2 Monate nach Beendigung dürfen Patientinnen **nicht schwanger** werden. Eine wirksame Empfängnisverhütung muss fortgesetzt werden.

Ihr Arzt wird Sie zu Beginn der Behandlung und regelmässig danach über **das Risiko von Fingolimod für das ungeborene Kind aufklären** und Sie über Massahmen beraten, um dieses Risiko möglichst gering zu halten.

Vor Beginn der Behandlung muss ein **durch den Arzt überprüfter, negativer Schwangerschaftstest vorliegen.** Schwangerschaftstests müssen in regelmässigen Abständen während der Behandlung wiederholt werden.

Da Fingolimod nach Absetzen der Behandlung noch bis zu ca. 2 Monate im Körper verbleibt, müssen Sie **während der Behandlung und bis zu 2 Monate danach eine zuverlässige Methode der Empfängnisverhütung** anwenden. Sprechen Sie mit Ihrem Frauenarzt über zuverlässige Empfängnisverhütung und legen Sie gemeinsam eine geeignete Methode fest.

Informieren Sie umgehend Ihren Arzt, falls Sie während der Behandlung mit Fingolimod oder bis zu 2 Monate danach glauben, schwanger zu sein, oder planen, schwanger zu werden. Die Behandlung mit Fingolimod muss dann sofort abgebrochen werden.

Falls Sie während der Behandlung mit Fingolimod schwanger geworden sind, wird der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin Sie über das Risiko für das ungeborene Kind beraten und die Auswirkungen auf die Schwangerschaft im Rahmen einer ärztliche Nachsorgeuntersuchung einschätzen.

Bitte informieren Sie umgehend Ihren Arzt, falls Sie nach Beendigung der Behandlung **eine Rückkehr der Krankheitsaktivität der Multiplen Sklerose** bei sich bemerken.

Diese Patientenkarte zur Schwangerschaft und weitere Unterlagen Produktinformationen sind zum Download auf der Webseite www.devatis.ch verfügbar.