

*Spazio riservato al timbro che
indica l'approvazione del testo*

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Calcitriolo Devatis

Che cos'è Calcitriolo Devatis e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Il principio attivo contenuto in Calcitriolo Devatis è il calcitriolo di sintesi, un prodotto naturale di grande efficacia derivante dal metabolismo della vitamina D. Il calcitriolo favorisce l'assorbimento del calcio dall'alimentazione e partecipa ai processi che regolano la formazione delle ossa. Calcitriolo Devatis è indicato perciò anche nella terapia dell'osteoporosi postmenopausale (diminuzione della massa ossea).

La produzione del calcitriolo è scarsa o del tutto assente nei pazienti con ridotta funzionalità renale. Una carenza di calcitriolo svolge un ruolo determinante nell'insorgenza di alterazioni patologiche delle ossa, come ad esempio in seguito a gravi malattie renali e a dialisi. Con la somministrazione di Calcitriolo Devatis è possibile prevenire queste conseguenze nocive.

Calcitriolo Devatis combatte anche i disturbi del metabolismo delle sostanze minerali che possono insorgere in seguito ad una ridotta funzionalità delle ghiandole paratiroidi.

La terapia con Calcitriolo Devatis si è dimostrata utile anche per curare diversi disturbi nella formazione delle ossa, noti col nome di rachitismo o malattia di Glisson.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

L'effetto di Calcitriolo Devatis è strettamente correlato all'alimentazione, specialmente al suo contenuto di calcio. È importante quindi che lei si attenga scrupolosamente alla dieta prescritta dal medico e che prenda soltanto i prodotti a base di calcio che le consiglia il medico.

Quando non si può assumere Calcitriolo Devatis?

Non deve assumere Calcitriolo Devatis se è ipersensibile a calcitriolo o ad altri componenti (vedi „Cosa contiene Calcitriolo Devatis?“). Calcitriolo Devatis è inoltre controindicato in presenza di malattie associate ad un aumento anormale dei livelli di calcio nel sangue.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Calcitriolo Devatis?

Dato che il calcitriolo, principio attivo di Calcitriolo Devatis, è il prodotto più efficace del metabolismo della vitamina D, durante la terapia con Calcitriolo Devatis non deve prendere nessun altro prodotto contenente vitamina D (per esempio olio di fegato di merluzzo). Se avverte i sintomi caratteristici di un contenuto eccessivo di calcio nel sangue - quali aumento della escrezione di urine, disidratazione, sete inestinguibile, perdita dell'appetito, perdita di peso, ritardo della crescita, nausea e vomito, vertigini, stitichezza con flatulenza dolorosa e debolezza muscolare, mal di testa, apatia, coma, depressione, disturbi della sensibilità, pressione arteriosa bassa, febbre, sensazione di sete, infezioni delle vie urinarie - deve interrompere il trattamento con Calcitriolo Devatis e avvertire il medico. Deve inoltre avvertire il suo medico, se durante la terapia nota delle reazioni da ipersensibilità (prurito, eritema, orticaria, arrossamento cutaneo).

Se ha già sofferto di calcoli renali o soffre di malattie cardiache, lo comunichi al medico.

Questo medicamento contiene 10,2 mg di sorbitolo per capsula.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Calcitriolo Devatis durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o se desidera diventarlo, deve assumere Calcitriolo Devatis esclusivamente dopo aver consultato il suo medico.

Dato che il calcitriolo può passare nel latte materno, il medico le prescriverà Calcitriolo Devatis dopo un accurato controllo e soltanto se assolutamente necessario.

Come usare Calcitriolo Devatis?

Data la rapida efficacia di Calcitriolo Devatis, è estremamente importante attenersi con la massima precisione alla posologia prescritta dal medico e alle sue istruzioni per quanto concerne l'alimentazione. Poiché la posologia può variare molto a seconda della malattia di base e della risposta di ogni singolo paziente alla terapia, non è possibile dare delle raccomandazioni di validità generale. In nessun caso deve aumentare di propria iniziativa la posologia prescritta dal medico o compensare una dose tralasciata aumentando quella successiva.

Ingerire le capsule, senza masticarle, con un bicchiere di acqua o di altro liquido.

La sicurezza e l'efficacia di Calcitriolo Devatis capsule nei bambini non sono state sufficientemente esaminate.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Calcitriolo Devatis?

Con l'assunzione di Calcitriolo Devatis possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Il principio attivo contenuto in Calcitriolo Devatis corrisponde al calcitriolo presente nell'organismo come prodotto naturale del metabolismo, per cui se la dose non supera il fabbisogno, il calcitriolo non provoca effetti collaterali. In caso di iperdosaggio può tuttavia verificarsi un aumento, anche pericoloso, dei livelli di calcio nel sangue.

Nel paragrafo „Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Calcitriolo Devatis?” è descritto come può manifestarsi un tale eccesso del contenuto di calcio nel sangue. Se persiste a lungo un leggero aumento del calcio nel sangue, possono formarsi depositi di sali di calcio nei tessuti molli. Se osserva effetti collaterali non descritti in questo paragrafo o nel paragrafo „Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Calcitriolo Devatis?” dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Ulteriori indicazioni

Dopo la conclusione della terapia o dopo la data di scadenza, i medicinali non utilizzati devono essere restituiti nella loro confezione originale alla sede di consegna (medico o farmacia) per lo smaltimento appropriato.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Calcitriolo Devatis?

Principi attivi

Calcitriolo Devatis contiene come principio attivo il calcitriolo. Una capsula molle arancione e bianca contiene 0,25 µg di calcitriolo, una capsula molle arancione contiene 0,5 µg di calcitriolo.

Sostanze ausiliarie

Gelatina, glicerolo (E422), sorbitolo liquido cristallizzabile (E420) (10,2 mg sorbitolo per capsula), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido, acqua depurata, butilidrossianisolo (E 320), butilidrossitoluene (E321), trigliceridi saturi a catena media..

Numero dell'omologazione

69164 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Calcitriolo Devatis? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Capsule da 0,25 µg: blister: 30 e 100.

Capsule da 0,5 µg: blister: 30 e 100.

Titolare dell'omologazione

Devatis AG, 6330 Cham.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2013 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).