Informazioni importanti per pazienti che assumono Ambrisentan Devatis (principio attivo Ambrisentan).

Controllo della funzione del fegato

- Ambrisentan può danneggiare il fegato. Quindi è importante che faccia esaminare regolarmente i valori del sangue dal Suo medico.
- I sintomi di seguito riportati possono indicare un malfunzionamento del fegato:
 - Mancanza di appetito; nausea; vomito; febbre; stanchezza anomala; dolori di stomaco;
 - Ingiallimento della pelle o della parte bianca degli occhi;
 - Urina scura; prurito cutaneo.
- Se riscontra uno o alcuni di guesti sintomi, informi subito il Suo medico.

Gravidanza


- Ambrisentan Devatis può causare gravi malformazioni in un nascituro concepito prima, durante o poco tempo dopo il trattamento.
- Non può quindi assumere Ambrisentan Devatis:
 Se è incinta o sta pianificando di rimanere incinta,
 - Durante il trattamento con Ambrisentan deve utilizzare un metodo contraccettivo affidabile (contraccezione di gravidanza).
 - Il Suo medico deciderà se dovrà sottoporsi regolarmente a dei test di gravidanza.
 - Se rimane incinta durante l'assunzione di Ambrisentan Devatis, contatti subito il Suo medico. Non allatti il bambino durante l'assunzione di Ambrisentan Devatis. La invitiamo a discuterne con il medico.

È estremamente importante comunicare eventuali sospetti di effetti collaterali dopo l'autorizzazione all'assunzione. La segnalazione degli stessi permette un monitoraggio continuo del rapporto tra i benefici e i rischi che il medicinale comporta. Qualora riscontrasse effetti collaterali, si rivolga al Suo medico o al Suo farmacista. Questo vale in particolare anche per gli effetti collaterali non indicati in questo foglietto illustrativo.

Versione 1. Stato: Febbraio 2021

Devatis AG, www.devatis.ch





Carta: 45 g/m2
Dimensioni piegata: 45 x 90 mm
L'inserto del pacchetto viene
consegnato piegato al centro.